

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA TK Z KONTRASTEM - wszystkie rodzaje badań tomografii komputerowej z użyciem środka kontrastowego

1. Na badanie należy przynieść
 - Dokument tożsamości
 - Oryginał skierowania
 - Płyty (CD) z poprzednimi badaniami obrazowymi (TK lub RM) okolicy ciała, która ma podlegać badaniu oraz wyniki badań USG tej okolicy – jeśli były wykonane; wyjątek stanowią Pacjenci wcześniej badani w ZDO ICZMP, których badania są na serwerze PACS
 - Wynik badania poziomu kreatyniny we krwi (wykonany nie wcześniej niż 3 miesiące przed badaniem) z obliczonym poziomem eGFR (nie jest wymaganiem bezwzględnym)

WYJATEK: pacjenci z istniejącymi czynnikami ryzyka niewydolności nerek (informacje w linku pt. [„Przygotowanie do badania TK z kontrastem – dodatkowa informacja dla Pacjentów z niewydolnością nerek”](#))

WYJATEK: pacjenci z chorobami tarczycy (informacje w linku pt. [„Przygotowanie do badania TK z kontrastem – dodatkowa informacja dla Pacjentów z chorobami tarczycy”](#))

2. Należy ubrać się w odzież nie posiadającą elementów metalicznych, które mogą wytwarzać artefakty w obrazach TK
3. Należy zgłosić się:
 - na czczo (4 godz. przed badaniem nie przyjmować posiłków stałych)
 - 2 godziny przed badaniem nie przyjmować płynów
 - zapisane na stałe leki wziąć w odpowiedniej dawce, popijają niewielką ilością płyn

WYJATEK: pacjenci chorzy na cukrzycę typu II (informacje w linku pt. [„Przygotowanie do badania TK z kontrastem – dodatkowa informacja dla Pacjentów z cukrzycą”](#))

4. Należy spożywać dużo płynów (1,5-2l/dobę) w ciągu doby poprzedzającej badanie oraz doby po badaniu
5. Chorzy na **astmę** powinni być zaopatrzeni w leki wziewne rozkurczające oskrzela
6. Pacjenci z **alergią na jodowe środki kontrastowe** w wywiadzie – zgłaszają się na badanie po premedykacji lekami glikokortykosteroidowymi lub/i lekami antyhistaminowymi wg zleceń lekarza prowadzącego.

Podanie środka kontrastowego nie zaburza karmienia piersią