

### **Tomografia komputerowej z kontrastem – dodatkowa informacja dla Pacjentów z cukrzycą**

Pacjenci chorzy na cukrzycę, ze względu na konieczność bycia na czczo modyfikują przyjmowanie leków na obniżenie glikemii.

Pacjenci leczeni **Insuliną** kontynuują podawanie leku wg. dotychczasowych wskazań.

Pacjenci leczeni **tabletkami doustnymi** – muszą sprawdzić czy ich lek zawiera **Metforminę**.

Pacjenci leczeni preparatami **zawierającymi Metforminę** (Metformin, Sjofor, Gluformin, Metformax, Glucophage, Avamina, Etoform, Formetic, Symformin itp.) biorą leki zależnie od poziomu eGFR:

- eGFR > 60ml/min/1,73m<sup>2</sup> – kontynuują przyjmowanie leków zawierających Metforminę
- eGFR < 60ml/ min/1,73m<sup>2</sup> – odstawiają leki zawierających Metforminę 48 godz. przed i po badaniu

Należy skonsultować się z prowadzącym lekarzem internistą lub diabetologiem w sprawie modyfikacji leczenia cukrzycy w czasie 4 dni (dwóch dni przed badaniem, dwóch dni po badaniu)– jeżeli Pacjent musi odstawić preparat Metforminy.